



GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin n° 14 du 12 juillet 1994

BETTERAVES :

Pucerons : pas d'intervention systématique

POIS PROTEAGINEUX :

Maladies : calme

Mildiou ça et là

POIS DE CONSERVE :

Tordeuse intensification du vol

BETTERAVES

Suite à de nombreux appels au sujet des parcelles Gaucho, quelques réflexions :

- Si les colonies de pucerons noirs sont importantes (plus de 20 à 25 pucerons par betterave) ...
- Si presque toutes les betteraves sont colonisées ...
- Si la récolte est prévue très tardivement ...

ALORS un traitement est envisageable MAIS le produit à utiliser alors, est un produit systémique à base d'oxydéméton-méthyl par exemple, qui est très néfaste aux auxiliaires (coccinelles, chrysopes).

Les symptômes de jaunisse inoculée actuellement seront visibles dans 7 à 8 semaines, soit début septembre seulement.

CONCLUSION :

VISITEZ VOS PARCELLES, RAISONNEMENT DU TRAITEMENT AU CAS PAR CAS.

POIS PROTEAGINEUX

► STADE :

Remplissage des gousses sur au moins 4 étages de fructification en toutes parcelles (ou presque). Bon niveau de potentiel.

► MALADIES :

Aucune évolution à cause du temps très sec, à l'exception de quelques symptômes de Mildiou ça et là sur feuilles et bouquets terminaux. Ne plus intervenir.

► **PUCERONS VERTS :**

Forte activité dans les parcelles non protégées. Fin de la période de risque.

BLE D'HIVER

► **STADE :**

Grain pâteux atteint presque partout.

► **EPIS BLANCS :**

Le plus souvent causés par le Piétin-verse ou par des phénomènes d'échaudage physiologique en parcelle avec mauvaise structure ou faible profondeur.

► **FUSARIOSE :**

Absence presque complète sur les épis.

► **PUCERONS DU FEUILLAGE :**

Souvent très présents en milieu de végétation et difficiles à contrôler par les insecticides.

► **PUCERONS DES EPIS :**

Fin de la période de risque. Ne plus intervenir nulle part en insecticides.

POIS DE CONSERVE

► **TORDEUSE EN FLANDRE :** Nette intensification du vol

Intervenir pour les parcelles en dernières dates de semis dès le stade gousse plate au 2ème niveau de fructification.

Tordeuse du pois : réseau SPV - AVRIL - DEVULDER et GHYS

| Poste | Nbre de captures depuis le 30 juin | TOTAL CUMULE |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Armbouts Cappel | 141 | 185 |
| Esquelbecq | 0 | 2 |
| Hoymille | 9 | 27 |
| Eperlecques | 18 | 58 |
| Offekerque | 83 | 94 |
| Bourbourg sud | 96 | 132 |
| Gravelines | 2 | 24 |
| Saint Georges/Aa | 64 | 76 |

Remarques : d'autres pièges tordeuse du pois ont été installés dans le Sud du Pas-de-Calais au contact de la Somme, secteur concerné par ce ravageur. Il n'y a aucune capture dans ces postes, aussi on peut confirmer la nette localisation du problème sur certains secteurs de Flandre Maritime.